




FELLESKATALOGEN og ny nettside

Bente By Jansen



FK-tekst ✓

Foto

Pasientinformasjon

SPC

Vis | Utskrift

Loette 28

Pfizer

Antikonsepsjonsmiddel.

ATC-nr.: G03A A07



Kan rekvireres av helsesøster og jordmor

Står ikke på WADAs dopingliste

[Indikasjoner](#) | [Dosering](#) | [Kontraindikasjoner](#) | [Forsiktighetsregler](#) | [Interaksjoner](#) | [Graviditet, amming og fertilitet](#) | [Bivirkninger](#) | [Overdosering og forgiftning](#) | [Egenskaper](#) | [Andre opplysninger](#) | [Pakninger, priser, refusjon og SPC](#)

[Miljørisiko i Norge](#) +

TABLETTER, filmdrasjerte: *Hver aktiv tablett inneh.:* Levonorgestrel 100 µg, etinyløstradiol 20 µg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). *Hver inaktiv tablett inneh.:* Laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

Indikasjoner

Felleskatalogtekst

Pakningsvedlegg

Siste besøkte sider (deaktiver) [Hjem](#) > [Loette 28](#)

Loette 28

Pfizer

Antikonsepsjonsmiddel.

G03A A07 (Levonorgestrel, Etinyløstradiol)



[Indikasjoner](#) | [Dosering](#) | [Instruksjonsfilmer](#) | [Legemiddelfoto](#) | [Kontraindikasjoner](#) | [Forsiktighetsregler](#) | [Interaksjoner](#) | [Graviditet, amming og fertilitet](#) | [Bivirkninger](#) | [Overdosering og forgiftning](#) | [Egenskaper og miljø](#) | [Andre opplysninger](#) | [Pakninger, priser, refusjon og SPC](#)

TABLETTER, filmdrasjerte: *Hver aktiv tablett inneh.:* Levonorgestrel 100 µg, etinyløstradiol 20 µg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). *Hver inaktiv tablett inneh.:* Laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

Indikasjoner

[Antikonsepsjon](#). Beslutningen om å forskrive Loette 28 bør være basert på den enkelte kvinnes nåværende risikofaktorer, spesielt risikofaktorer for venøs tromboembolisme.



Siste besøkte sider ([deaktiver](#)) [Hjem](#) > [Loette 28](#)

Loette 28

Pfizer

Antikonsepsjonsmiddel.

G03A A07 (Etinyløstradiol, Levonorgestrel)



[Indikasjoner](#) | [Dosering](#) | [Instruksjonsfilmer](#) | [Legemiddelfoto](#) | [Kontraindikasjoner](#) | [Forsiktighetsregler](#) | [Interaksjoner](#) | [Graviditet, amming og fertilitet](#) | [Bivirkninger](#) | [Overdosering og forgiftning](#) | [Egenskaper og miljø](#) | [Andre opplysninger](#) | [Pakninger, priser, refusjon og SPC](#)

TABLETTER, filmdrasjerte: *Hver aktiv tablett inneh.:* Levonorgestrel 100 µg, etinyløstradiol 20 µg, laktose, hjelpestoffer. *Fargestoff:* Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). *Hver inaktiv tablett inneh.:* Laktose, hjelpestoffer. *Fargestoff:* Titandioksid (E 171).

Indikasjoner

[Antikonsepsjon](#). Beslutningen om å forskrive Loette 28 bør være basert på den enkelte kvinnes nåværende risikofaktorer, spesielt risikofaktorer for venøs tromboembolisme.

Dosering

Behandling skal ikke startes ved mistanke om graviditet. Ved påvist graviditet seponeres legemidlet. Tablett 1-21 er aktive tabletter, mens tablett 22-28 er inaktive tabletter. Tablettene må tas i den rekkefølgen som er angitt på brettet. 1 tablett tas daglig i 21 påfølgende dager, etterfulgt av 7 dager med inaktive tabletter. I perioden med inaktive tabletter inntreffer en bortfallsblødning som starter 2-3 dager etter siste aktive tablett, og vil kunne vare inntil neste brett påbegynnes.

Ingen tidligere hormonell antikonsepsjonsbruk (i løpet av siste måned): 1. tablett tas på dag 1 i kvinnens normale syklus. Det er mulig å starte på dag 2-7, men da anbefales tilleggsprevensjon (f.eks. kondom og sæddrepende middel) de 7 første dagene.

Skifte fra et annet kombinasjonspreparat: Bruk av Loette 28 skal helst starte dagen etter siste aktive tablett i den foregående pakningen med kombinasjonspreparat, og ikke senere enn dagen

<https://www.felleskatalogen.no/medisin/loette-28-pfizer-561058#indikasjoner>

<https://www.felleskatalogen.no/medisin/loette-28-pfizer-561058#legemiddelfoto>

<https://www.felleskatalogen.no/medisin/loette-28-pfizer-561058#instruksjonsfilmer>

<https://www.felleskatalogen.no/medisin/loette-28-pfizer-561058#bivirkning>

<https://www.felleskatalogen.no/medisin/loette-28-pfizer-561058#pakninger>

Administrering: Tas oralt hver dag til omtrent samme tid, og sammen med noe å drikke.



Legemiddelfoto



Instruksjonsfilmer



Film pasient



▶ Loette 28 tabletter

Instruksjonsfilm for bruk av p-piller.
29.09.2016




▶ Loette 28 tablets, English

Instruction movie for birth control pills.
15.11.2017



Graviditet, amming og fertilitet

Bruk under graviditet - Legemiddelhåndboken


Etinyløstradiol

Se p-piller 

Levonorgestrel

Se p-piller  og gestagener 

Gestagener

Enkelte gestagener (etisteron, noretisteron) har vært assosiert med virilisering av genitalia i jentefostre, spesielt ved bruk av høye doser. Hypospadi har også vært rapportert, men årsakssammenhengen er ikke sikker. Det er ingen holdepunkter for at gestagener i de doser som inngår i hormonelle antikonsepsjonsmidler medfører risiko for skadelige effekter. Se p-piller 

Bruk under amming - Legemiddelhåndboken

Se [Kontraindikasjoner](#).

Graviditet: Skal ikke brukes under graviditet. Dersom graviditet inntreffer skal behandlingen avsluttes umiddelbart. Epidemiologiske studier har ikke vist økt risiko for fødselsdefekter hos barn født av kvinner som brukte kombinasjons-p-piller før graviditeten, eller teratogen effekt ved utilsiktet inntak tidlig i graviditeten. Den økte risikoen for venøs tromboembolisme i postpartum-perioden bør tas i betraktning når behandling gjenopptas etter fødsel.

Loette 28

Pfizer

Virkestoff: [Levonorgestrel](#), [Etinyløstradiol](#)



Pakningsvedlegg



[Bruksområder](#) | [Forsiktighetsregler](#) | [Bruksmåte](#) | [Legemiddelfoto](#) | [Instruksjonsfilmer](#) | [Bivirkninger](#) | [Oppbevaring](#) | [Ytterligere informasjon](#)

 Les avsnitt

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Loette 28 filmdrasjerte tabletter

levonorgestrel/etinyløstradiol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem om de har symptomer på sykdom som ligner dine.





Siste besøkte sider ([deaktiver](#)) [Hjem](#) > [ATC-register](#) > [Loette 28](#)

Loette 28

Pfizer

Antikonsepsjonsmiddel.

G03A A07 (Etinyløstradiol, Levonorgestrel)



[Indikasjoner](#) | [Dosering](#) | [Instruksjonsfilmer](#) | [Legemiddelfoto](#) | [Kontraindikasjoner](#) | [Forsiktighetsregler](#) | [Interaksjoner](#) | [Graviditet, amming og fertilitet](#) | [Bivirkninger](#) | [Overdosering og forgiftning](#) | [Egenskaper og miljø](#) | [Andre opplysninger](#) | [Pakninger, priser, refusjon og SPC](#)

TABLETTER, filmdrasjerte: *Hver aktiv tablett inneh.:* Levonorgestrel 100 µg, etinyløstradiol 20 µg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). *Hver inaktiv tablett inneh.:* Laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).

Indikasjoner


Antikonsepsjon. Beslutningen om å forskrive Loette 28 bør være basert på den enkelte kvinnes nåværende risikofaktorer, spesielt risikofaktorer for venøs tromboembolisme.

Dosering

Behandling skal ikke startes ved mistanke om graviditet. Ved påvist graviditet seponeres legemidlet. Tablett 1-21 er aktive tabletter, mens tablett 22-28 er inaktive tabletter. Tablettene må tas i den rekkefølgen som er angitt på brettet. 1 tablett tas daglig i 21 påfølgende dager, etterfulgt av 7 dager med inaktive tabletter. I perioden med inaktive tabletter inntreffer en bortfallsblødning som starter 2-3 dager etter siste aktive tablett, og vil kunne vare inntil neste brett påbegynnes.

Ingen tidligere hormonell antikonsepsjonsbruk (i løpet av siste måned): 1. tablett tas på dag 1 i kvinnens normale syklus. Det er mulig å starte på dag 2-7, men da anbefales tilleggsprevensjon (f.eks. kondom og sæddrepende middel) de 7 første dagene.

Skifte fra et annet kombinasjonspreparat: Bruk av Loette 28 skal helst starte dagen etter siste aktive tablett i den foregående pakningen med kombinasjonspreparat, og ikke senere enn dagen



Tilbakemeldinger!